

Änderungsdatei zur Anlage 1 Übersicht der Messzahlen

Stand: Dezember 2014

Anlage 1 wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt 1 (Abgeteilte orale Darreichungsformen) wird wie folgt geändert:

a) Folgende Positionen werden abgeändert:

	N1	N2	N3
Antidota	10	30	100
– Deferasirox	30	90	300
Antivirale Mittel	25	50	100
– Protease-Inhibitoren	180	360	540
• Fosamprenavir	20	60	200
– NNRTI/NRTI	20	60	200
Zytostatika/Metastasenhemmer	30	60	120
– Nilotinib	40	120	400

b) Folgende Positionen werden gestrichen:

	N1	N2	N3
Antivirale Mittel	25	50	100
– NNRTI/NRTI	20	60	200
• Etravirin	20	60	200
• Nevirapin	14	60	120

2. Abschnitt 2 (Nicht abgeteilte Darreichungsformen zur oralen Anwendung) wird wie folgt geändert:

a) Folgende Positionen werden ergänzt:

	N1	N2	N3
Antivirale Mittel	25	50	100
– Protease-Inhibitoren	180	360	540
• Darunavir ≤ 150 mg	60	180	600
Laxantien	10	30	50
– Bisacodyl	10	30	100

3. Abschnitt 3 (Darreichungsformen zur rektalen und vaginalen Anwendung) wird wie folgt geändert:

a) Folgende Positionen werden abgeändert:

	N1	N2	N3
1. Abgeteilte Darreichungsformen zur rektalen Anwendung			
Laxantien	6	12	30
• mit Glycerol und Kombinationen	3	6	30
• mit Sorbitol und Kombinationen	4	10	–

4. Abschnitt 4 (Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion) wird wie folgt geändert:

a) Folgende Position wird abgeändert:

	N1	N2	N3
Antidiabetika			
Exenatid	–	1	3

b) Folgende Position wird gestrichen:

	N1	N2	N3
Zytostatika und Metastasenhemmer	1	5	10
– <i>Alemtuzumab</i>	–	3	–

5. Abschnitt 6 (Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten) wird wie folgt geändert:

a) Folgende Position wird abgeändert:

	N1	N2	N3
2. Besonderheiten nach Anwendungsgebieten			
Antiallergika			
– Adrenalin Autoinjektor	1 St	2 St ¹⁾	–

1) Diese Messzahl bezieht sich nicht auf eine Reichdauer von 30 Tagen, sondern deckt einen erhöhten Bedarf im Rahmen der Notfallmedikation ab.

b) Folgende Position wird gestrichen:

	N1	N2	N3
2. Besonderheiten nach Anwendungsgebieten			
Dosieraerosole und Pulverinhalationssysteme (Einzeldosen):			
– mit Sympathomimetika und Parasympatholytika	10	30	100
* Kombination aus Indacaterol und Glycopyrroniumbromid	10	30	100